



SPLENDID COMBIBEST

Mikro Bitki Besin Maddeleri Karışımı
Micro Nutrient Mix

Garanti Edilen İçerik :	%W/W
Bor	% 1
Bakır	% 0,5
Demir	% 5
Mangan	% 3
Çinko	% 3
Molibden	% 0,05

GUARANTEED CONTENT :	%W/W
Boron	% 1
Copper	% 0,5
Iron	% 5
Manganese	% 3
Zinc	% 3
Molibden	% 0,05

Ambalaj Package	1 kg, 5 kg
-------------------	------------



ÜRÜN PRODUCT	UYGULAMA DÖNEMİ APPLICATION PERIOD	YAPRAKTAN UYGULAMA BY SPRAY (per 100 lt water)	TOPRAKTAN UYGULAMA BY DRIP (clear)
Sebzeler Vegetables	Çiçeklenme başlangıcında ve 2-3 hafta ara ile. At the beginning of flowering and every 2-3 weeks	50 - 100	100 - 200
Narenciyeler Citrus	Çiçeklenme öncesi, Haziran meyve dökümünden önce, yaz sürgününde Before flowering, before June fruit casting, in summer exile	50 -100	100 - 200
Elma, Armut vb. Apple, pear, etc.	Meyveler ceviz iriliğine ulaştığında ve yaz sürgününde When the fruits reach walnut size and	50 - 100	100 - 200
Şeftali, Kayısı, Kiraz vb. Peach, apricot, cherry, etc.	Çiçeklenme sonrası ve 2 hafta sonra After flowering and after 2 weeks.	50 - 100	100 - 200
Bağ Vineyard	Salkımların kapanmasından hemen önce ve 2 hafta ara ile 1-2 uygulama. Just before the clusters close and 1-2 applications with an interval of 2 weeks.	100 - 200	200 - 400
Celtik Paddy (rice)	Kardeşleme başlangıcında, Sapa kalkma döneminde ve 1 ay sonra At the beginning of brotherhood, growing body and 1 month later.	300	
Mısır Corn	Bitki 40-50 cm boyda iken. At the time when the plant is 40-50 cm tall	300	
Pamuk Cotton	Taraklanmadan önce ve takriben 2 hafta sonra. Before carding and about 2 weeks later.	200	
Şeker Pancarı Sugar beet	6 yaprak dönemi ve 1 ay sonra. 6 leaves period and 1 month later	300	
Soğan Onion	Dikimden 30 gün sonra ve takiben 2 hafta sonra. 30 days after planting and after 2 weeks following	250	
Yer fıstığı - Soya Peanut - Soybean	Çiçek tomurcuğu döneminde ve takiben 2 hafta sonra. During the flower bud period and after 2 weeks following	250	
Kavun, Karpuz Melon, watermelon	Çıkıştan 1-2 ay sonra takiben 1-2 hafta ara ile. 1-2 months after exit, followed by 1-2 week intervals.	200	400
Süs Bitkileri Ornamental plants	Büyüme başlangıcı ve takiben 2 hafta ara ile. Beginning of the growth and afterwards with an interval of 2 weeks.	50 - 100	100 - 200
Fındık Hazelnut	Yaprak teşekkülünde ve takiben 1 ay sonra. At leaf formation and after approx. 1 month.	50 - 100	100 - 200
Buğday Wheat	Kardeşleme döneminde. At brotherhood period.	300	



SPLENDID
COMBIBEST

ANTILSAN

GÜVENCESİYLE

With Antilsan Assurance

ÖZELLİKLERİ

- ✔ Mikro besin eksikliklerinin önleyici veya iyileştirici tedavisi için mikro besinli bir gübredir.
- ✔ İçerdiği mikro besinler tamamen şelatlıdır. Bu, anında kullanılabilirlik ve hızlı alım sağlar ve tesiste erken sabitlenmeyi önler.
- ✔ Geniş Ph aralığında çalışabilen bir iz element karışımıdır.
- ✔ Hem topraktan ,hem yapraktan kullanıldığıında maximum etkiye sahiptir.
- ✔ Bilindiği üzere iz elementlerin birbirlerine olan oranı bitkinin beslenmesi açısından da çok önemlidir.
- ✔ Ürümüzde iz element oranları optimum sonuç alınacak şekilde dizayn edilmiştir.

FEATURES

- ✔ It is a micronutrient fertilizer for the preventive or curative treatment of micronutrient deficiencies.
- ✔ All metallic micronutrients are fully chelated. This ensures immediate availability and fast retrieval and prevents premature fixation on site.
- ✔ It is a trace element mixture that can work in a wide pH range.
- ✔ It has maximum effect when used from both soil and leaves.
- ✔ As known, the ratio of trace elements to each other is very important in terms of plant nutrition. These ratio is designed in the way to get optimum results in SPLENDID COMBIBEST.

antilsan